

Camonea umbellata (L.) A. R. Simoes & Staples

Identifiants : 121441/camoumbe

Association du Potager de mes (nos) Rêves
(<https://lepotager-demesreves.fr> - <https://terralisme.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 08/08/2026

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Lamiidées ;
- Ordre : Solanales ;
- Famille : Convolvulaceae ;



- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Solanales ;
- Famille : Convolvulaceae ;
- Genre : Camonea ;

- **Synonymes :** Convolvulus aristolochiifolius Mill.; Convolvulus caracassanus Willd. ex Roem. & Schult.; Convolvulus cymosus Desr.; Convolvulus luteus M. Martens & Galeotti; Ipomoea cymosa (Desr.) Roem. & Schult.; Merremia umbellata (Linn.) Hallier f.; and others ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** , Bongki irpik, Gorla lota, Guna bendung, Kalmau, Kolia lota, Tianpa, Toklangot, Turnaisa, ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Détails : Les jeunes feuilles sont consommées comme herbe potagère. Les feuilles récoltées peuvent être conservées pendant 3 à 4 jours.{{{0(+x)}} (traduction automatique)

Original : The young leaves are eaten as a potherb. The harvested leaves can be stored for 3-4 days{{{0(+x)}}



Précautions : néant, inconnus ou indéterminés.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Angami, A., et al, 2006, Status and potential of wild edible plants of Arunachal Pradesh. Indian Journal of Traditional Knowledge 5(4) October 2006, pp 541-550 (As Ipomoea cymosa)Baro, D., Baruah, S. and Borthukar, S. K. 2015, Documentation on wild vegetables of Baksa district, BTAD (Assam). Scholars Research Library. Archives of Applied Science Research, 2015, 7 (9):19-27 (As Merremia umbellata)Burkill, H. M., 1985, The useful plants of west tropical Africa, Vol. 1. Kew. (As Merremia umbellata)Dutta, U., 2012, Wild Vegetables collected by the local communities from the Churang reserve of BTAD, Assam. International Journal of Science and Advanced Technology. Vol. 2(4) p 122 (As Merremia umbellata)Kar, A., et al, 2013, Wild Edible Plant Resources used by the Mizos of Mizoram, India. Kathmandu University Journal of Science, Engineering and Technology. Vol. 9, No. 1, July, 2013, 106-126 (As Merremia umbellata)Kew Plants of the World OnlinePatiri, B. & Borah, A., 2007, Wild Edible Plants of Assam. Geethaki Publishers. p 88 (As Merremia umbellata)Sarma, H., et al, 2010, Updated Estimates of Wild Edible and Threatened Plants of Assam: A Meta-analysis. International Journal of Botany 6(4): 414-423 (As Merremia umbellata)Teron, R. & Borthakur, S. K., 2016, Edible Medicines: An Exploration of Medicinal Plants in Dietary Practices of Karbi Tribal Population of Assam, Northeast India. In Mondal, N. & Sen, J.(Ed.) Nutrition and Health among tribal populations of India. p 150 (As Ipomoea cymosa)World Checklist of Useful Plant Species 2020. Royal Botanic Gardens, Kew