

Prunus persica (L.) Batsch

Identifiants : 26755/prunpera

Association du Potager de mes (nos) Rêves
(<https://lepotager-demesreves.fr> - <https://terralisme.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 25/07/2026

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Rosales ;
- Famille : Rosaceae ;



- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Rosales ;
- Famille : Rosaceae ;
- Genre : Prunus ;

- **Synonymes :** Amygdalus persica L, Persica vulgaris Mill, et d'autres ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** Nectarine, , Aadu, Aaru, Aaruu, Aru, Boksanamu, Chekom, Dao, Delaoji mikhri, Durazno, Glae, Ke momo, Kham-bu, Krishi, Likphi-kyanyi-ngu-sa-ngum, Limpentjisi, Melocoton, Me-man, Mfysoki, Mikriashi, Mpiasi, Nara bogori, Pecher, Persico duraznero, Persico, Persik, Peso, Pfirsichbaum, Phai-zong, Piichi, Shaftalu, Shanzi, Tao zi, Tao, Tao he, Thei dakte, Umpentijisi, Yetaozi ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Détails : Les fruits mûrs sont consommés frais, conservés ou vinifiés. Ils sont mis en conserve, farcis, transformés en confiture et en jus et utilisés dans les gâteaux, les tartes et les cornichons. L'huile de graines est utilisée pour la cuisson. **ATTENTION:** Les types amers de noyaux d'abricot contiennent de l'amygdaline qui libère du cyanure et est toxique à moins d'être enlevé par la cuisson. Les feuilles sont utilisées comme levure dans la fabrication du pain^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)
Original : Ripe fruit are eaten fresh, preserved or made into wine. They are canned, stuffed, made into jam and juice and used in cakes, pies and pickles. The seed oil is used for cooking. **CAUTION:** The bitter kinds of apricot kernels contain amygdalin which releases cyanide and is poisonous unless removed by cooking. The leaves are used as a yeast starter in bread making^{{{{0(+x)}}}

- **Partie testée :** fruits - crus^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique) | Original : Fruit - raw^{{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
86.2	156	37	0.6	500	8	0.4	0.1



Précautions : cf. consommation

- **Liens, sources et/ou références** :

dont classification :